

## Nevibolol BSS <sup>[1]</sup>

Cada tableta contiene 5 mg de nebivolol. **Indicaciones.** Tratamiento de la hipertensión esencial. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca estable leve y moderada crónica, además de las terapias estándar en pacientes de edad avanzada > 70 años. **Posología.** Hipertensión. Adultos. 5mg diarios. En los pacientes con insuficiencia renal, la dosis inicial recomendada es de 2.5 mg al día. En pacientes mayores de 65 años, la dosis inicial recomendada es de 2.5 mg al día. No se recomienda su uso en niños y adolescentes. Insuficiencia Cardíaca Crónica. 1.25 mg de nebivolol, que se aumentará a 2.5 mg de nebivolol una vez al día, y luego a 5 mg una vez al día y luego a 10 mg una vez al día. L dosis máxima recomendada es de 10 mg una vez al día. No es necesario ajustar la dosis en la insuficiencia renal leve a moderada. No se recomienda en insuficiencia renal severa. No se requiere ajuste de la dosis en adultos mayores. **Contraindicaciones.** Hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los excipientes. Insuficiencia hepática o deterioro de la función hepática. Insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico o episodios de descompensación por insuficiencia cardíaca que requieren terapia inotrópica i.v. Síndrome del seno enfermo, incluyendo bloqueo sinoauricular. Bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado (sin un marcapasos). Historia de broncoespasmo y asma bronquial. Feocromocitoma no tratado. Acidosis metabólica. Bradicardia (frecuencia cardiaca < 60 latidos por minuto antes de comenzar la terapia). Hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mmHg). Trastornos circulatorios periféricos severos **Precacuciones de uso.** Debe tenerse precaución con ciertos anestésicos que causan depresión miocárdica. Los antagonistas beta-adrenérgicos no deben utilizarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva no tratada. Los antagonistas beta-adrenérgicos pueden inducir bradicardia. utilizarse con precaución en pacientes con trastornos circulatorios periféricos, en pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado, en pacientes con angina de Prinzmetal. Nebivolol puede enmascarar ciertos síntomas de hipoglucemia. Precaución en pacientes con trastornos pulmonares obstructivos crónicos. Pueden aumentar la sensibilidad a los alérgenos y la gravedad de las reacciones anafilácticas. No debe utilizarse en embarazo. No se recomienda en lactancia materna. **Efectos Adversos.** Dolor de cabeza, mareos, parestesia. Disnea. Estreñimiento, náuseas, diarrea. Cansancio, edema. Agravamiento de Insuficiencia Cardíaca. Hipotensión postural. Intolerancia al fármaco. Bloqueo aurículoventricular de primer grado. **CDS Abril 2015.** Nevibolol 5 mg disponible para: Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

---

**Source URL:** <https://www.sandozca.com/es/nevibolol-bss>

### Links

[1] <https://www.sandozca.com/es/nevibolol-bss>